## DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE ÁGUA EM CARCAÇAS DE FRANGOS CONGELADOS COMERCIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG

SILVA, G. C.1; SÁ, M. A. R.2; NASCIMENTO, M. R. B. M.3; COSTA, V. L.4

Como o consumo da carne de frango teve crescimento acelerado nas últimas décadas, diversos órgãos de defesa do consumidor têm alertado para o excesso de água contido em carcaças de frango congelado. Assim, esta pesquisa objetivou avaliar se o percentual de água contido em carcaças de frangos congelados comercializadas em Uberlândia-MG se ajusta ao que prevê a legislação. Foram coletadas, entre 8 e 11 de agosto de 2005, seis amostras por lote de quatro marcas, as quais foram analisadas no Laboratório

de Controle da Qualidade em Saúde, da vigilância sanitária desse município. O percentual de água foi determinado pelo Drip Test (teste por gotejamento), que apontou duas (50%) marcas como insatisfatórias. Assim, os órgãos públicos de inspeção devem intensificar a fiscalização para evitar que o consumidor pague no preço do frango pelo excesso de água no produto.

**Palavras-chave:** Carcaças, percentual de água congelada frango.

Mestranda em Ciências Veterinárias, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG. Fone: (34) 9137-3276. gracielec@yahoo.com.br

Médico Veterinário. Professor do Curso de Nutrição – UNITRI / Coordenador da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Uberlândia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Médica Veterinária. Professora Adjunto. Doutora. FAMEV-UFU, Uberlândia-MG.

Nutricionista. Autônoma, Uberlândia-MG.